

# VOTRE ROUTINE AVEC RYBELSUS®

Comment le prendre

Pourquoi c'est important

**RYBELSUS® est utilisé pour réduire la glycémie (glucose) chez les adultes atteints de diabète de type 2.**

RYBELSUS® (comprimés de sémaglutide) est utilisé en monothérapie si votre glycémie n'est pas bien maîtrisée par un régime alimentaire et par l'exercice seuls, et si vous ne pouvez pas prendre de la metformine, ou en association avec un ou plusieurs autres médicaments contre le diabète lorsque ces derniers ne permettent pas une maîtrise adéquate de votre glycémie.

Pr **RYBELSUS®**  
comprimés de sémaglutide

Posologie de  
RYBELSUS® :  
**Pensez à 1-1-1**

---

**1 comprimé à jeun.**

**1 gorgée d'eau  
et attendre une  
demi-heure.**

**1 fois par jour.**

- **Ne pas** couper, écraser, ni croquer le comprimé RYBELSUS®.
- **Ne pas** retirer le comprimé de la plaquette alvéolée avant d'être prêt à le prendre. RYBELSUS® est sensible à l'humidité et à la lumière. Si vous le retirez trop tôt, il risque de ne pas fonctionner comme prévu.
- **Ne pas** cesser de prendre RYBELSUS® sans en parler à votre professionnel de la santé. Si vous arrêtez de le prendre, votre glycémie risque d'augmenter.

Ouvrir pour obtenir  
tous les détails >



Peut être différent de la taille réelle

# COMMENCER ET CONTINUER RYBELSUS®

## DOSE DE DÉPART

**3**  
mg

3 mg une fois par jour pendant 30 jours



## DOSES DE MAINTIEN

**7**  
mg

Augmenter la dose à 7 mg une fois par jour pendant au moins 30 jours

**RESTER ensuite à 7 mg – OU**



**14**  
mg

Si votre glycémie n'est pas maîtrisée avec 7 mg une fois par jour après 30 jours, **AUGMENTER et RESTER** à 14 mg une fois par jour

## Comment le prendre



**Avaler le comprimé  
en entier et à jeun  
(p. ex., au réveil)**




**Prendre le comprimé  
avec une gorgée d'eau  
(pas plus de 120 ml)**

**Pourquoi c'est  
important**

**Une trop grande quantité  
d'eau (> 120 ml) peut  
réduire l'absorption  
de RYBELSUS®.**

## Comment le prendre



**Attendre au moins 30 minutes  
avant de manger, de boire ou de prendre  
un autre médicament par voie orale**

**Pourquoi c'est  
important**

**Ne pas attendre assez  
longtemps (< 30 minutes)  
peut réduire l'absorption  
de RYBELSUS®.**

# Des questions?

Veuillez consulter le feuillet d'information pour le patient ou communiquer avec votre professionnel de la santé.



**Pour en savoir plus,  
visitez [Rybelsus.ca/fr](https://Rybelsus.ca/fr)\***  
Balayez le code QR.



\* Rybelsus.ca/fr est ouvert au grand public.

© 2023 Novo Nordisk Canada Inc.  
RYBELSUS® est une marque de commerce déposée de Novo Nordisk A/S, utilisée sous licence par Novo Nordisk Canada Inc.  
**Novo Nordisk Canada Inc.**, tél. : 905-629-4222  
ou 1-800-465-4334. [caf.novonordisk.ca](https://caf.novonordisk.ca)



Pr **RYBELSUS**®  
comprimés de sémaglutide

CA23RYB00020F